

Izotretinoīns un *erythema multiforme* risks

Zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumu standartteksts

Atsauces dokuments
CMDh/PhVWP/021/2010
2010. gada marts

ZĀĻU APRAKSTS

4.8 apakšpunkts visiem iekšķīgi lietojamiem izotretinoīna preparātiem

<i>Ādas un zemādas audu bojājumi:</i>	
Ļoti bieži ($\geq 1/10$)	Heilīts (lūpu iekaisums), dermatīts, sausa āda, lokalizēta ādas lobīšanās, nieze, eritematozi izsitumi, trausla āda (berzes traumu risks)
Reti ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$)	Alopēcija (matu izkrišana)
Ļoti reti ($\leq 1/10\ 000$)	<i>Acne fulminans</i> , aknes uzliesmojumi, sejas eritēma, eksantēma, matu slimības, hirsutisms, nagu distrofija, paronihija, fotojutīguma reakcijas, piogēna granuloma, ādas hiperpigmentācija, pastiprināta svīšana
Nezināms biežums	<i>Erythema multiforme</i>

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Nopietni ādas izsitumi (*erythema multiforme*) sākumā parādās kā apaļi laukumi, bieži centrā atrodas pūslis. Parasti skar ādu uz rokām, plaukstām un kājām, kāju pēdām, bet var skart jebkuru ķermeņa daļu. Ja parādās šādi izsitumi, pārtrauciet lietot /zāļu nosaukums/ un sazinieties ar savu ārstu.