

Konvencionālie (tipiskie) antipsihotiskie līdzekļi un palielināts mirstības risks vecākiem cilvēkiem ar demenci

Zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumu standartteksts

Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Palielināta mirstība vecākiem cilvēkiem ar demenci

Divu lielu novērojumu pētījumu dati liecināja par nedaudz palielinātu mirstības risku gados vecākiem cilvēkiem ar demenci, kas tika ārstēti ar antipsihotiskiem līdzekļiem, salīdzinot ar tiem, kas antipsihotiskos līdzekļus nesaņēma. Nav pietiekamu datu, lai precīzi aprēķinātu riska lielumu. Palielinātā riska iemesls nav zināms.

(*Zāļu oriģinālnosaukums*) nav reģistrēts ar demenci saistītu uzvedības traucējumu ārstēšanai.

Lietošanas instrukcija

4. sadaļa. Iespējamie blakus efekti

Ziņots par nedaudz palielinātu nāves gadījumu skaitu gados vecākiem cilvēkiem ar demenci, kas lietojuši antipsihotiskos līdzekļus, salīdzinot ar tiem, kas antipsihotiskos līdzekļus nebija lietojuši.