

Antipsihotiskie līdzekļi un venozas trombembolijas (VTE) risks

Zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumu standartteksts

Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Saistībā ar antipsihotisko līdzekļu lietošanu saņemti ziņojumi par venozas trombembolijas (VTE) gadījumiem. Pacientiem, kurus ārstē ar antipsihotiskiem līdzekļiem, bieži mēdz būt iegūtie VTE riska faktori. Tāpēc pirms ārstēšanas sākšanas ar {zāļu oriģinālnosaukums} un tās laikā jānosaka visi iespējamie VTE riska faktori un jāveic profilaktiski pasākumi.

4.8. apakšpunkts. Nevēlamas blakusparādības

Ja konkrētām zālēm nav datu par blakusparādību gadījumiem:

Saistībā ar antipsihotiskiem līdzekļiem ziņots par venozas trombembolijas gadījumiem, to vidū plaušu emboliju un dziļo vēnu trombozi. To rašanās biežums nav zināms.

Ja konkrētām zālēm ir dati par blakusparādību gadījumiem:

Venoza trombembolija jāiekļauj blakusparādību sarakstā.

Lietošanas instrukcija

2. sadaļa. Ievērojiet piesardzību, lietojot {oriģinālnosaukums};

Ja Jums vai kādam Jūsu ģimenes loceklim agrāk bijusi asins recekļu veidošanās vēnās, jo saistībā ar šā veida zāļu lietošanu novērota asins recekļu veidošanās vēnās.

4. sadaļa. Iespējamie blakus efekti.

Asins recekļi vēnās, īpaši kāju vēnās (izpaužas ar dedzināšanas sajūtu kājā, sāpēm un apsārtumu), kas pa asinsvadiem var pārvietoties un nonākt plaušās, izraisot sāpes krūtīs un apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat jebkuru no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.