

Papildu hipotensīvs efekts, ko rada neselektīvo alfa adrenoblokatoru (doksazosīns, terazosīns, prazosīns) un 5. tipa fosfodiesterāzes inhibitoru (piemēram, sildenafilis, tadalafils, vardenafils) vienlaikus lietošana

Standartteksts neselektīvo alfa adrenoblokatoru (doksazosīns, terazosīns, prazosīns) zāļu aprakstam (4.4.; 4.5.) un lietošanas instrukcijai

Zāļu apraksts

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

„Dažiem pacientiem 5. tipa fosfodiesterāzes inhibitoru (piemēram, sildenafilis, tadalafils, vardenafils) un (*zāļu nosaukums*) vienlaikus lietošana var radīt simptomātisku hipotensiju. Lai mazinātu ortostatiskas hipotensijas attīstības risku, pirms 5. tipa fosfodiesterāzes inhibitoru lietošanas sākšanas terapijai ar alfa blokatoru jābūt nostabilizētai.”

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

„5. tipa fosfodiesterāzes inhibitori (piemēram, sildenafilis, tadalafils, vardenafils) (skatīt 4.4. apakšpunktu)”

[Atkarā no 4.5. apakšpunkta struktūras konkrētā preparāta zāļu aprakstā, ievadrindkopa jāpapildina ar šādu tekstu:

„*Dažiem pacientiem 5. tipa fosfodiesterāzes inhibitoru (piemēram, sildenafilis, tadalafils, vardenafils) un (zāļu nosaukums) vienlaikus lietošana var radīt simptomātisku hipotensiju. (skatīt 4.4. apakšpunktu)*”

Lietošanas instrukcija

2. sadaļa. Citu zāļu lietošana

„Dažiem pacientiem, kas lieto alfa blokatorus augsta arteriālā spiediena vai palielinātas prostatas ārstēšanai, var būt galvas reibšana vai apreibuma sajūta, kuru iemesls var būt arteriālā spiediena pazemināšanās, pacientam strauji pieceloties vai apsēžoties. Minētie simptomi novēroti atsevišķiem pacientiem, kas vienlaikus ar alfa blokatoriem lietojuši zāles, kuras paredzētas erektilas disfunkcijas (impotences) ārstēšanai. Lai mazinātu šo simptomu rašanās iespējamību, pirms sākat lietot zāles, kas paredzētas erektilas disfunkcijas ārstēšanai, alfa blokatoru regulārai dienas devai jābūt stabili noregulētai.”