

Valproskābes mijiedarbība ar karbapenēmiem
Zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumu standartteksts

ZĀĻU APRAKSTS

4.4. apakšpunkts. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Valproskābes/nātrija valproāta un karbapenēmu vienlaikus lietošana nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Valproskābes un karbapenēmu vienlaikus lietošanas gadījumā ziņots par valproskābes līmeņa samazināšanos asinīs par 60 – 100% divu dienu laikā. Tiek uzskatīts, ka straujās un stipri izteiktās valproskābes līmeņa samazināšanās dēļ pacientiem ar stabilizētu valproskābes terapiju valproskābes vienlaikus lietošana ar karbapenēmiem nav kontrolējama un tāpēc no tās jāizvairās (skatīt 4.4. apakšpunktu).

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

2. sadaļa.

Pirms X lietošanas ...

Citu zāļu lietošana

Noteikti pastāstiet ārstam vai medicīnas māsai, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

Karbapenēmi (antibiotiski līdzekļi bakteriālu infekciju ārstēšanai). Jāizvairās no valproskābes vienlaikus lietošanas ar karbapenēmiem, jo tie var mazināt nātrija valproāta darbību.